

**Комплексная защита капусты**

Вредный объект	Препарат	Фазы развития растений				
		Семенной материал	Рассада 3-4 листа	Рассада 5-6 листьев (при рассадном выращивании)	Начало образования кочана	Наращение диаметра кочана
Комплекс вредителей (капустная и репная белянка, капустная совка (гусеница), капустная моль)	Фитоверм М, КЭ (2 г/л)				Двукратные обработки 1,6 л/га с интервалом 5-7 дней по мере появления вредителей	
Бактериозы (слизистый, сосудистый)	Фитолавин, ВРК	Полусухое протравливание семян 5 л/т	Опрыскивание или полив под корень 0,2% рабочим раствором	Опрыскивание или полив под корень 0,2% рабочим раствором препарата. Через 7-10 дней после высадки растений на постоянное место - 2 л/га. Норма расхода рабочей жидкости 400-500 л/га	Опрыскивание или полив под корень через 3 недели после предыдущей обработки. Норма расхода препарата 2 л/га	
Вирусные инфекции	Фармайод			Опрыскивание 0,5 л/га по мере появления вредителей с интервалом 10 дней		

Обработка Фитолавином в фазе рассады в виде опрыскивания должна быть обильной вплоть до стекания препарата с поверхности растений

Фитолавин не использовать в баковой смеси с препаратами, содержащими живые бактерии

Препарат Фитоверм используется по мере появления вредителей при температуре не ниже 18°C

Препараты совместимы с большинством пестицидов и агрохимикатов, за исключением сильнощелочных, однако при использовании препарата в баковой смеси с другими пестицидами, необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемой культуре