

Комплексная защита томата, перца и баклажана

Вредный объект	Препарат	Фазы развития растений						
		Семена	2-3 настоящих листа	5-6 настоящих листьев	Бутонизация (фаза развития зачатков цветков)	Формирование завязи	Рост плодов	Созревание
Столбур	Фитолавин, ВРК	-	Полив 0,2% рабочим раствором (30-50 мл раствора на растение)	-	Опрыскивание или полив 0,2% рабочим раствором через 10-14 дней после высадки растений на постоянное место	-	-	-
	Фармайод	-	-	Опрыскивание 0,05% рабочим раствором	-	-	-	-
	Фитоплазмин, ВРК	-	-	-	-	Опрыскивание 3-4 л/га с начала лета цикадки (май-июнь), далее 2-3-кратно с интервалом 10-14 дней, расход рабочей жидкости 300-600 л/га		
Цикадки (переносчики столбура)	Фитоверм 1%, КЭ	-	-	-	Опрыскивание 0,2% рабочим раствором во время лета вредителя (сдвоенные обработки)			-
Бактериальные инфекции (бактериальный рак, корневые гнили, некроз сердцевины стебля, мягкая бактериальная гниль, бактериальная пятнистость)	Фитолавин, ВРК	Предпосевное замачивание в 0,1% рабочем растворе на 1 час	Опрыскивание или полив под корень 0,2% рабочим раствором (30-50 мл раствора на растение)	-	Опрыскивание или полив 0,2% рабочим раствором с интервалом 15 дней. Для растений открытого грунта 2 л/га по мере появления симптомов			
Вирусные инфекции, сложный стрик	Фармайод	Замачивание в 0,5% рабочем растворе препарата на 30 минут с обязательной последующей промывкой проточной водой	-	Для растений защищенного грунта: опрыскивание 0,05-0,08% рабочим раствором или полив под корень 0,06-0,1% рабочим раствором препарата через 7-10 дней после высадки рассады на постоянное место, последующие с интервалом в 7-14 дней и по мере появления симптомов. Для растений открытого грунта: опрыскивание с нормой расхода препарата 0,5 л/га				
Комплекс вредителей (клещи, трипсы, хлопковая совка, томатная минирующая моль и др.)	Фитоверм 5%, КЭ	-	Опрыскивание 0,04% рабочим раствором во время лета вредителя (сдвоенные обработки)					
	Фитоверм 1%, КЭ	-	Сдвоенные обработки по мере появления вредителей 0,2% рабочим раствором с интервалом 5-6 дней при температуре 25-35°C, 7-9 дней при температуре 20-25°C, 10 дней при температуре 18°C					

Препараты совместимы с большинством пестицидов и агрохимикатов, за исключением сильнощелочных, однако при их использовании в баковой смеси с другими пестицидами, необходимо проверить смесь на совместимость и фитотоксичность. Фитолавин не использовать в баковой смеси с препаратами, содержащими живые бактерии.